

ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ СЕРЕД ЖИТЕЛІВ МІСТ ТА СІЛ СУМЩИНИ

Білик О. П., Столяренко К. А., студ. 3-го курсу

Науковий керівник – Мадяр В.В.

Сумський державний університет, кафедра загальної хірургії

За критеріями ВООЗ з 1995 р. в Україні зареєстровано епідемію туберкульозу а з 1990 р. до 1999 р. смертність зросла в 2,4 рази і серед сільського населення вона вища на 10,7%. В 2003 р. захворюваність туберкульозом складала 77,6 на 100 тис.

В Сумській області проживає в містах 2/3 або 849,9 тис. (64,9%) жителів а в селах – 1/3 або 456,8 тис. (35,1%).

Розподіл хворих за місцем проживання:

Форма туберкульозу	Місто	Село	Загальна кількість
Циротичний	10	18	28
Туберкуломи	44	41	85
Інфільтративний	40	40	80
Дисемінований	11	27	38
Фіброзно-кавернозний	58	69	
Кавернозний	21	24	127
Всього	184	217	401
%	45,89±3,67	54,11±3,38	100

Аналіз даних таблиці вказує на те що рівень захворюваності жителів сіл Сумської області в 3,5 рази (див. табл.) вищий за такий в містах, що є загрозливою ланкою в епідеміологічному процесі сучасного туберкульозу.

Отже, проживання на селі, в важких соціально-економічних умовах, підвищує рівень захворюваності на розповсюджений туберкульоз. Також наведені дані свідчать про незадовільний, та гірший ніж в містах, рівень медичного забезпечення селян, нижчу його якість, руйнацію системи регулярного диспансерного огляду населення та флюорографії.